



ДОБРИВА LUBOFOSY

Всі добрива Lubofos є комплексними гранульованими добривами. Характерною особливістю цих добрив є різноманітність форм фосфору. У кожній гранулі присутні сполуки фосфору дуже добре розчинні у воді (аналогічно, як у суперфосфаті), а також важкорозчинні фосфати кальцію. Це дуже корисна формула, оскільки вона враховує фізіологію накопичення фосфору більшістю сільськогосподарських рослин. У початковий період росту рослини фосфор необхідний для створення сильної кореневої системи і в цей період будуть вивільнюватися фосфатні аніони із легкорозчинних форм, що містяться в добриві. Другий період підвищеного накопичення фосфору припадає на кінець вегетаційного періоду, у період розвитку зернівок і насіння. До цього часу з гранул вивільнялися сполуки фосфору з меншою розчинністю. Відповідно, рослини належним чином забезпечені фосфором протягом усього періоду вегетації, а не тільки на ранніх стадіях розвитку. Добрива Lubofos є найрізноманітнішою, з точки зору асортименту, групою продукуваних нами добрив. Спектр їх застосування дуже широкий, оскільки він включає в себе поточне забезпечення вирощуваних рослин мінеральними елементами, поліпшення родючості ґрунту, тобто підготовку поля для наступної рослини, підживлення багаторічних плантацій та високу ефективність на слабокислих і кислих, а також на деградованих ґрунтах. У цій групі також знаходяться добрива, хімічний склад яких розроблений для конкретних сільськогосподарських культур з урахуванням не тільки співвідношення калію і фосфору в добриві, але й для специфічних потреб окремих сортів. Наприклад, у добривах, призначених для підживлення кукурудзи, міститься цинк і бор, цукрових буряків - натрій і бор, ріпаку - бор, а в добриві Lubofos для картоплі - частину калію додано у сульфатній формі. Така формула дозволяє проводити комплексне підживлення плантацій усіма потрібними мінеральними компонентами, необхідно тільки поповнення азоту. У пропозиції є також безхлорне добриво Lubofos, призначене в першу чергу для культур, чутливих до високих концентрацій хлору в ґрунтовому розчині (більшість садових рослин). Великою перевагою цих добрив є також високий вміст кальцію і сульфату сірки з різними швидкостями вивільнення в ґрунт. Обидва компоненти відповідають за здоров'я рослин, а також значно підвищують ефективність підживлення азотом.

LUBOFOS® 5-10-25

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.
NPK (S) 5-10-25-(15)

- під усі сільськогосподарські культури, особливо коренеплоди, озимий ріпак, кормові рослини
- рекомендується при вирощуванні сірколюбних рослин, тобто ріпаку, капусти, часнику і цибулі
- особливо рекомендується для ґрунтів з дефіцитом калію
- при вирощуванні озимих рослин забезпечує необхідну кількість азоту в осінній період
- у випадку ярих рослин дозволяє зменшити весняні дози азоту

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

5%	аміачний азот (N)
10%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний в мінеральних кислотах
5%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію і воді
2,5%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у воді
25%	оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді
15%	триоксид сірки (SO ₃), розчинний у воді

ЗАСТОСУВАННЯ

Внесення добрива Lubofos® 5-10-25 краще всього здійснювати перед посівом. Після застосування добрива змішати з ґрунтом на глибині до 10-20 см. Добриво не містить компонентів, що обмежують схожість насіння, що дозволяє використовувати його безпосередньо перед посівом оброблюваної рослини.


У випадку весняного підживлення цукрових буряків добриво слід вносити в ґрунт за 10-14 днів до посіву насіння, особливо, коли одноразово використовується велика доза добрива. Для лук та пасовищ бажано розділити рекомендовану дозу на дві частини і здійснити перше внесення добрива раною весною, а друге - після першого скошування, або після другого випасу.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
озимі зернові	200	150	100
ярі зернові	200	150	100
озимий ріпак	300	200	100
соняшник	250	180	100
кукурудза	250	180	100
цукровий буряк	300	200	100
Картопля	250	180	100
зернобобові	250	180	100
сінокоси	300	200	100
бобові з травами - зелена маса	300	200	100
трави при польовому травосіянні - зелена маса	300	200	100



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:




LUBOFOS® UNIVERSAL

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.
NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21-(2-2,5-14,5)



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



гранульоване передпосівне добриво

універсальне - для підживлення усіх сільськогосподарських культур (як зернових, ріпаку, цукрових буряків, кукурудзи, так і постійних лук)

у випадку озимих сортів збільшує зимостійкість і морозостійкість рослин

мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 1,00 до 1,05 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N)	3,5%
п'ятиокис фосфору (P_2O_5), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. в 55% п'ятиокису фосфору (P_2O_5), розчинний у 2% розчині мурашиної кислоти	10%
оксид калію (K_2O), розчинний у воді	21%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді	2%
оксид магнію (MgO) загальний	2,5%
триоксид сірки (SO_3) загальний	14,5%

ЗАСТОСУВАННЯ

На постійних луках може застосовуватися як перед зимовим спокоєм рослин, так і у період початку вегетації. Дозу добрива слід визначити, враховуючи потреби підживлення рослин для визначеної врожайності та родючості ґрунту.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
озимі зернові	250	180	100
ярі зернові	200	150	100
озимий ріпак	350	250	100
цукровий буряк	250	180	100
картопля	250	180	100
кукурудза	300	200	100
соняшник	300	200	100
зернобобові	200	150	100
сінокоси	300	200	100
бобові з травами – зелена маса	350	250	100
трави при польовому травосіянні – зелена маса	350	250	100

LUBOFOS® 12

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.4.

PK (Ca, Mg, S) 12-20- (2-4,5-6)

- для підживлення усіх культурних рослин, вирощуваних на полях
- через високий вміст калію у співвідношенні до фосфору рекомендується для вирощування коренеплодів
- через необхідний для тварин магній рекомендується для вирощування зернових та для використання на луках і пасовищах
- дуже хороші розсіювальні властивості
- мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів



ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 1,05 до 1,15 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.pawozy.pl



ВЛАСТИВОСТІ

12%	п'ятиокис фосфору (P_2O_5), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. в 55% п'ятиокису фосфору (P_2O_5), розчинний у 2% розчині мурашиної кислоти
20%	оксид калію (K_2O), розчинний у воді
2%	оксид кальцію (CaO) розчинний у воді
4,5%	оксид магнію (MgO) загальний
6%	триоксид сірки (SO_3) загальний



ЗАСТОСУВАННЯ

Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® 12 перед посівом, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту. Добриво підходить для всіх ґрунтів, незалежно від їх щільності та лужної реакції.

Для луків та пасовищ бажано розділити дозу на дві частини і здійснити перше внесення добрива ранньою весною, а друге - після першого скошування або після другого випасу.




ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
озимі зернові	300	200	100
ярі зернові	250	180	100
ріпак	350	250	100
цукровий буряк	350	250	100
картопля	250	180	100
зернобобові	250	180	100
сінокоси	350	250	100
бобові з травами – зелена маса	400	300	100
трави при польовому травосіянні – зелена маса	400	300	100
кукурудза	350	250	100
соняшник	350	250	100




Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:





Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



LUBOFOS® 12 MAK

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.4.
PK (Ca, Mg, S) 12-25- (2-2,5-6)

- гранульоване добриво, що використовується перед посівом усіх рослин, вирощуваних на полях, передусім на ґрунтах, бідних на калій та магній
- через високий вміст калію рекомендується для вирощування рослин із значною потребою цієї речовини (коренеплоди, озимий ріпак, багаторічні трави)
- у зв'язку з вмістом магнію рекомендується для вирощування зернових і трав
- мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95% Насипна густина: 1,00 до 1,05 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

п'ятиокис фосфору (P_2O_5), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. в 55% п'ятиокису фосфору (P_2O_5), розчинний у 2% розчині мурашиної кислоти	12%
оксид калію (K_2O), розчинний у воді	25%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді	2%
оксид магнію (MgO) загальний	2,5%
триоксид сірки (SO_3) загальний	6%

ЗАСТОСУВАННЯ

На постійних луках доцільно розділити дозу на дві частини і використовувати першу дозу раною весною, а другу - після першого скошування або після першого випасу. Добриво слід рекомендувати для удобрення в сівозміні для регулювання родючості ґрунту для РОСЛИНИ, яка його найбільше потребує. Перемішати добриво з ґрунтом до глибини 10-15 см під час передпосівної підготовки ґрунту.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
озимі зернові	250	180	100
ярі зернові	200	150	100
озимий ріпак	350	250	100
цукровий буряк	250	180	100
картопля	250	180	100
зернобобові	200	150	100
сінокоси	300	200	100
бобові з травами – зелена маса	350	250	100
трави при польовому травосіянні – зелена маса	350	250	100
кукурудза	300	200	100
соняшник	300	200	100

LUBOFOS® ПІД РІПАК

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.

НРК (Ca, Mg, S) 3,5-10-18,5-(2-2,5-14,5) З БОРОМ (B) 0,2

- особливо рекомендується для використання при вирощуванні ріпаку
- також рекомендується для внесення під інші хрестоцвіті рослини (гірчиця, парило, різні види капусти)
- задовольняє специфічні потреби ріпаку на сірку, бор і марганець
- забезпечує високу врожайність
- у випадку озимих сортів збільшує зимостійкість і морозостійкість рослин
- дуже добрі розсіювальні властивості



ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,95 до 1,05 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.pawozy.pl



ВЛАСТИВОСТІ

3,5%	аміачний азот (N)
10%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п'ятиокису фосфору (P ₂ O ₅), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти
18,5%	оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді
2%	оксид кальцію (CaO), розчинний у воді
2,5%	оксид магнію (MgO) загальний
14,5%	триоксид сірки (SO ₃) загальний
0,2%	бор (B) загальний



ЗАСТОСУВАННЯ

Найвища ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® під Ріпак перед посівом, змішуючийого з ґрунтом на глибини до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту.




ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
озимі зернові	250	180	100
ярі зернові	200	150	100
озимий ріпак	300	200	100
соняшник	300	200	100
кукурудза	300	200	100
зернобобові	250	180	100



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



LUBOFOS® RS

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.
NPK (Ca, Mg, S) 3,5-8-21-(2-2,5-15,5) З БОРОМ (В) 0,2



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



гранульоване передпосівне добриво	●
особливо рекомендується для використання при вирощуванні озимого ріпаку	●
також успішно може використовуватися для підживлювання зернових, кукурудзи, та для використання на постійних луках	●
задовольняє специфічні потреби ріпаку на сірку і бор	●
у випадку озимих сортів збільшує зимостійкість і морозостійкість рослин	●
дуже добрі розсіювальні властивості	●

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,95 до 1,05 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N)	3,5%
п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п'ятиокису фосфору (P ₂ O ₅), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти	8%
оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді	21%
оксид кальцію (CaO), розчинний у воді	2%
оксид магнію (MgO) загальний	2,5%
триоксид сірки (SO ₃) загальний	15,5%
бор (В) загальний	0,2%

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовувати не пізніше, ніж за 5-10 днів перед посівом рослин. Після внесення змішати з ґрунтом на глибині до 10-15 см На постійних луках застосовувати ранньою весною перед початком вегетації рослин рівномірно розподіляючи по поверхні луки. У випадку, якщо необхідно внести більшу кількість добрива, частину дози використовувати у перший термін, а решту після першого скошування або після першого випасу тварин.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
озимий ріпак	300	200	100
злаки	250	180	100
зернобобові	200	150	100
кукурудза	300	200	100
соняшник	300	200	100
цукрові буряки	250	180	100
Постійні луки	300	200	100

LUBOFOS® ПІД БУРЯКИ

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.

НРК (Ca, Na, S) 3,5-10-21-(2-2,2-14,5) З БОРОМ (В) 0,2

- особливо рекомендується для використання при вирощуванні цукрових буряків
- задовольняє специфічні потреби буряків у натрії і борі
- забезпечує отримання високих врожаїв
- співвідношення калію до фосфору (2:1) відповідає потребам буряка
- у садівництві рекомендується використовувати під деревами з високою потребою у борі під яблунями, вишнями, персиками і грушами
- також рекомендується для вирощування овочів, що потребують великої кількості бору, а саме: різні сорти капусти, морква, селера
- дуже добрі розсіювальні властивості



ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.pawozy.pl



ВЛАСТИВОСТІ

3,5%	аміачний азот (N)
10%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п'ятиокису фосфору (P ₂ O ₅), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти
21%	оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді
2%	оксид кальцію (CaO), розчинний у воді
2,2%	натрій (Na) загальний
14,5%	триоксид сірки (SO ₃) загальний
0,2%	бор (В) загальний



ЗАСТОСУВАННЯ

Добриво Lubofos® під Буряки є гранульованим добривом для передпосівного використання. Після внесення добриво повинно бути добре перемішане з ґрунтом. Наявність амонієвої форми азоту, яка добре зв'язується в ґрунті, робить добриво придатним для використання у будь-які передпосівні строки. Якщо потрібні великі дози компонентів, рекомендується виконувати підживлення не пізніше, ніж за 10-14 днів до посіву буряків.

В садівництві підживлювання слід здійснювати після збору врожаю фруктів. В овочівництві висів добрив слід виконувати під час операцій з підготовки поля.




ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
низький	середній	високий
400	250	100

УВАГА! При відсутності використання перегною вказані дози необхідно збільшити на 75%.



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



LUBOFOS® ПІД КУКУРУДЗУ

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.

NPK (Ca, S) 5-10-21-(2-18,5) З БОРОМ (B) 0,09, ЦИНКОМ (Zn) 0,20



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



- особливо рекомендується для підживлення кукурудзи
- забезпечує високий вихід зерна, ссм (Corn-Cob-Mix), силосу, зеленої маси
- задовольняє специфічні потреби кукурудзи у фосфорі і цинку - критичних елементах для досягнення високих врожаїв
- крім того, рекомендується для вирощування гороху, цибулі та льону
- через вміст цинку і бору також рекомендується для вирощування фруктів і овочів
- дуже добрі розсіювальні властивості

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.pawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N)	5%
п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п'ятиокису фосфору (P ₂ O ₅), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти	10%
оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді	21%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді	2%
триоксид сірки (SO ₃) загальний	18,5%
бор (B) загальний	0,09%
цинк (Zn) загальний	0,2%

ЗАСТОСУВАННЯ

Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® під Кукурудзу перед посівом, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту. Можливе також внесення стартової дози добрива, тобто його висівання разом з насінням кукурудзи. Єдиною умовою застосування стартового внесення є наявність типової сівалки для одночасного посіву насіння кукурудзи та добрива.

В садівництві підживлення слід здійснювати після збору врожаю фруктів. В овочівництві висів добрив слід виконувати під час операцій з підготовки поля.

ДОЗУВАННЯ [кг/га] при вирощуванні зернової кукурудзи і ССМ*

Вміст засвоюваного калію і фосфору в ґрунті**		
низький	середній	високий
300	200	100

* При вирощуванні кукурудзи на силос доза добрива для поля середньої та низької родючості збільшується на 50 кг/га

** У ситуації, коли обидва компоненти належать до різних класів врожайності, доза добрива визначається для компонента, що знаходиться у нижчому класі.

LUBOFOS® ПІД КАРТОПЛЮ

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.

NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

- особливо рекомендується для підживлення картоплі
- переважно для використання на ґрунтах, бідних калієм, із середнім вмістом фосфору, а також без органічного підживлення
- дуже позитивно впливає на якість бульб і вміст крохмалю завдяки вмісту калію у сульфатній формі
- дуже добрі розсіювальні властивості
- мікроелементи, що містяться в ньому, покращують засвоєння інших компонентів



ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дл
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.pawozy.pl



ВЛАСТИВОСТІ

3,5%	аміачний азот (N)
7%	п'ятиокис фосфору (P_2O_5), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п'ятиокису фосфору (P_2O_5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти
25%	оксид калію (K_2O) у хлоридній та сульфатній формі, розчинний у воді
2,5%	оксид магнію (MgO) загальний
19,5%	триоксид сірки (SO_3) загальний



ЗАСТОСУВАННЯ

Найвища ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® під Картоплю навесні перед саджанням картоплі, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час обробки ґрунту.




ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Органічне підживлення	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті*		
	низький	середній	високий
на перегної	350	300	200
без перегною	500	400	300

* Якщо вміст фосфору і калію в ґрунті дозволяє віднести їх до одних і тих же класів родючості, вказані дози потрібно збільшити на 15-20%



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:




LUBOFOS® БЕЗХЛОРНИЙ 3,5-10-15

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИПВ.1.1.

НРК (Ca, Mg, S) 3,5-10-15-(2-2,5-27,5)



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



для підживлення рослин, що погано переносять високі концентрації хлору (картопля, кущі, фруктові дерева, овочі, квіти, саджанці троянд, тютюн і хміль)

через вміст сірки також рекомендується для вирощування сірколюбних культур (бобові, ріпак, капуста)

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,95 до 1,1 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.pawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N)	3,5%
п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п'ятиокису фосфору (P ₂ O ₅), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти	10%
оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді	15%
оксид кальцію (CaO), розчинний у воді	2%
оксид магнію (MgO) загальний	2,5%
триоксид сірки(SO ₃)загальний	27,5%

ЗАСТОСУВАННЯ

Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® Безхлорний перед посівом, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту. Добриво підходить для всіх ґрунтів, незалежно від їх щільності та лужної реакції.

При використанні для підживлення рослин під час вегетації рекомендується застосувати добриво під час однієї з операцій по догляду за садами і розсадниками. Добриво необхідно рівномірно розподілити навколо дерев і кущів і вміру можливості змішати його з ґрунтом.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
овочі, при польовому вирощуванні*	350	300	250
дерева і кущі	400	300	200
картопля	500	400	300
полуниця, малина	300	250	200
тютюн, хміль	400	350	300
цибуля	550	400	250
саджанці троянд і дерев	500	350	250
капуста	300	250	200

* Вказані приблизні значення; слід враховувати специфічні потреби окремих видів рослин.